

散布処理

令和3年12月8日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	適用時期	使用量 / 10a当り		本剤の使用回数	グリホサートを含む農薬の総使用回数																
				薬量 (ml)	希釈水量 (L)																		
果樹類 (かんきつを除く)	-	一年生雑草	収穫7日前まで - 雑草生育期 -	250~500	通常散布 50~100	3回以内	3回以内																
かんきつ		多年生雑草		500~1000	100																		
かんきつ		マルバツユクサ	-	-	1000~2000	通常散布50-100 少量散布25~50	3回以内	5回以内															
		スギナ			2000																		
		一年生雑草			250~500																		
		多年生雑草			500~1000																		
水田作物 (水稲を除く)		-	一年生雑草	耕起 20~10日前まで - 雑草生育期 -	250~500	50~100	1回	2回以内															
移植水稲									は種30日前~出芽前 - 雑草生育期 - - 乾田耕起栽培 -														
直播水稲										50													
水田作物 (水田畦畔)										水田畦畔	多年生雑草	収穫14日前まで - 雑草生育期 -	500~1000	50~100	1回	3回以内							
	水田作物 (水田刈跡)																水田刈跡	一年生雑草	250~500				
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡									多年生雑草	500~1000	50~100	1回	1回									
水田作物、畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期	250~500	50~100	1回	3回以内																
								多年生雑草	500~1000														
豆類 (種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)	-	一年生雑草	耕起前又はは種前まで - 雑草生育期 -	250~500	少量散布 25~50	2回以内	2回以内																
だいず								は種10日以前 - 雑草生育期 -	3回以内	4回以内													
野菜類 (だいこん、えだまめ、ねぎ、たまねぎ、トマト、きゅうり、 なす、ほうれんそう、レタス、アスパラガス、オリーブ(葉)、 しゃくやく(薬用)、たらんぎ、びわ(葉)、にんじん、 ピーマン、とうがらし類、薬用にんじんを除く)								-			-	-	-	-	-	-							
																	えだまめ	は種後出芽前 - 雑草生育期 -	少量散布 25~50				
ねぎ								-			-	-	-	100	1回	1回							
たまねぎ								-			-	-	-	-	-	-							
																	は種後出芽前 - 雑草生育期 -	少量散布 25~50					
トマト、きゅうり、なす、ほうれんそう レタス、アスパラガス、オリーブ(葉) しゃくやく(薬用)、たらんぎ、びわ(葉)								-			-	-	-	100	1回	3回以内							
だいこん、にんじん、ピーマン、とうがらし類								-			-	-	-	100	1回	2回以内							
薬用にんじん								-			-	-	-	100	1回	10回以内 (1年間に2回以内)							
麦類 (小麦を除く)								-			一年生雑草	耕起前又はは種前まで - 雑草生育期 -	250~500	50~100	3回以内	3回以内							
小麦																	多年生雑草	500~750					
雑穀類																	一年生雑草	250~500					
いも類 (かんしょを除く)																	-	-	-	-	-	-	-
飼料用とうもろこし	-	一年生及び 多年生雑草	耕起前又はは種前まで - 雑草生育期 -	250~500	50~100	2回以内	2回以内																
さとうきび	圃場内の 周縁部	一年生雑草	収穫30日前まで - 雑草生育期 -	500~1000	少量散布 25~50	1回	6回以内																
								多年生雑草	250~500														
茶	茶園	一年生雑草	摘採7日前まで - 雑草生育期 -	250~500	50~100	2回以内	2回以内																
牧草	牧野、草地 (更新・造成)	多年生雑草	更新・造成の 10日以前 - 雑草生育期 -	500~1000	50	2回以内	3回以内																
								一年生及び 多年生雑草	は種10日前~は種当日 - 耕起整地後 - - 雑草発生揃期 -	250~500													
林木	造林地 (地ごしらえ)	ススキ、ササ類等の 多年生雑草	生育盛期以降 - 夏~秋期 -	1000	30	1回	1回																
樹木類	-	一年生雑草	-	250~500	50~100	4回以内	4回以内																
樹木等	公園、庭園、 堤とう、駐車場、 道路、運動場、 宅地、のり面、 鉄道 等	多年生雑草	雑草生育期	500	100	3回以内	3回以内																
								スギナ	2000	50~100													

注入処理

作物名	適用場所	適用雑草名	適用時期	希釈倍数	使用液量	使用方法	本剤の使用回数	グリホサートを含む農薬の総使用回数
林木	林地	クズ・フジ等の つる類	生育初期	原液 又は 2倍液	つる径2cm以下 2.1~3.0 3.1~4.0 4.1~5.0 5.1cm以上	0.5 ml / 株 1.0 1.5 2.0 適宜増量	つる注入 処理	1回
					1 ml / 力所 樹径10cm以下 10~20cm 20cm以上	2~3 力所 4~8 10		
	林地 放置竹林	竹類	夏期	原液	5~10 ml / 本	竹稈注入 処理	1回	